

# KOMBINATORYKA 1 – Struktury kombinatoryczne

23 stycznia 2020

## 1 Zbiory częściowo uporządkowane

Niech  $X$  będzie dowolnym zbiorem (niekoniecznie skończonym). Relację binarną  $\preceq$  na zbiorze  $X$  nazywamy *częściowym porządkiem*, gdy jest ona zwrotna, przechodnia i antysymetryczna, a parę  $(X, \preceq)$  nazywamy *zbiorem częściowo uporządkowanym* lub, używając angielskiego skrótu, *posetem*. Jeżeli  $x \preceq y$  i  $x \neq y$ , to piszemy  $x \prec y$ . Zamiast  $x \preceq y$  i  $x \prec y$ , możemy pisać również  $y \succeq x$  i  $y \succ x$ . Jeżeli  $x \preceq y$  lub  $y \preceq x$ , to mówimy, że elementy  $x$  i  $y$  są *porównywalne*.

Skończony zbiór częściowo uporządkowany można reprezentować za pomocą grafu skierowanego.

### Przykład 1: Graf porównań

Niech  $X = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ . Określmy relację częściowego porządku na  $X$  w następujący sposób:

$$\begin{aligned} a &\preceq b, a \preceq c, a \preceq d, a \preceq e, a \preceq f, a \preceq g, a \preceq h \\ b &\preceq c, b \preceq d, b \preceq e, b \preceq f, b \preceq h \\ c &\preceq e, c \preceq f \\ d &\preceq e, d \preceq f, d \preceq h \\ e &\preceq f \\ g &\preceq f, g \preceq h \end{aligned}$$

Ten częściowo uporządkowany zbiór  $(X, \preceq)$  możemy przedstawić w postaci grafu skierowanego zwanego *grafem porównań*, przyjmując, że jeżeli  $x \preceq y$ ,

to istnieje łuk skierowany od wierzchołka  $x$  do wierzchołka  $y$ . Proszę ten graf narysować na ćwiczeniach.

Drugim, bardziej czytelnym, sposobem reprezentacji skończonego zbioru częściowo uporządkowanego jest *diagram Hassego*. W celu jego opisanie musimy wprowadzić pojęcie bezpośredniego następnika (lub poprzednika) danego elementu. Otóż, jeżeli  $x \prec y$  oraz dla dowolnego  $z \in X$

$$(x \preceq z) \wedge (z \preceq y) \Rightarrow (z = x) \vee (z = y), \quad (1)$$

to piszemy  $x \lesssim y$  i mówimy, że  $y$  jest *bezpośrednim następnikiem* elementu  $x$  (lub  $x$  jest *bezpośrednim poprzednikiem* elementu  $y$ ).

Możemy teraz przejść do reprezentacji zbioru częściowo uporządkowanego  $(X, \preceq)$  za pomocą grafu skierowanego zwanego *diagramem Hassego*. Wierzchołki tego grafu odpowiadają elementom należącym do zbioru  $X$ , przy czym  $(x, y)$  jest łukiem grafu wtedy i tylko wtedy, gdy  $x$  jest *bezpośrednim* poprzednikiem  $y$ . Można jednak pominąć skierowanie krawędzi, przyjmując zasadę, że jeśli  $x \lesssim y$ , to wierzchołek  $y$  znajduje się na diagramie wyżej od wierzchołka  $x$ . Wówczas  $x \preceq y$  wtedy i tylko wtedy, gdy w diagramie Hassego istnieje ścieżka „w górę” od wierzchołka  $x$  do wierzchołka  $y$ .

### Przykład 1 (cd). Diagram Hassego

Niech  $(X, \preceq)$  będzie zbiorem częściowo uporządkowanym z przykładu 1. Proszę narysować diagram Hassego dla tego zbioru.

### Przykład 2. Podzbiory zbioru skończonego

Niech  $X$  będzie skończonym zbiorem,  $|X| = n$ . Wtedy  $\mathcal{B}(n) = (2^X, \subseteq)$  jest posetem, zwanym też *kratą boolowską*. Narysować  $\mathcal{B}(n)$  dla kilku małych wartości  $n$ .

### Przykład 3. Podziały zbioru skończonego na podzbiory

Niech  $X$  będzie skończonym zbiorem,  $|X| = n$ , a  $\Pi(X)$  rodziną wszystkich podziałów zbioru  $X$  na niepuste i parami rozłączne podzbiory (kolejność podzbiorów nieistotna). Dla  $\pi_1, \pi_2 \in \Pi$ , piszemy  $\pi_1 \preceq \pi_2$ , gdy podział  $\pi_1$  jest *rozdrobnieniem* podziału  $\pi_2$ , tzn. każdy blok podziału  $\pi_1$  jest podzbiorem pewnego bloku podziału  $\pi_2$ . Wtedy  $\mathcal{P}(n) = (\Pi(X), \preceq)$  jest posetem. Narysować  $\mathcal{P}(n)$  dla kilku małych wartości  $n$ .

Niech  $(X, \preceq)$  będzie dowolnym zbiorem częściowo uporządkowanym i niech  $Y \subset X$ . Oznaczmy przez  $\preceq_Y$  obcięcie porządku  $\preceq$  do zbioru  $Y$ . Wtedy  $(Y, \preceq_Y)$  jest też posetem.

#### Przykład 4. Liczby naturalne z relacją podzielności

Piszemy  $m|n$  gdy  $n$  jest podzielne przez  $m$ . Para  $(\mathbb{N}, |)$  jest posetem. Narysować diagram Hassego dla obcięcia  $(Y, |_Y)$  posetu  $(\mathbb{N}, |)$  do zbioru  $Y = \{1, 2, \dots, 13\}$ .

Jeżeli  $\preceq_Y$  jest porządkiem liniowym (tzn. każde dwa elementy należące do  $Y$  są porównywalne), to zbiór  $Y$  nazywamy *łańcuchem*. Innymi słowy, łańcuch to zbiór, który jest liniowo uporządkowany przez częściowy porządek. W przypadku, gdy żadne dwa elementy zbioru  $Y$  nie są porównywalne, to  $Y$  nazywamy *antyłańcuchem*.

Przykładami łańcuchów w zbiorze częściowo uporządkowanym z przykładu 1 są  $abc, abe, af, g$ , a antyłańcuchów:  $eh, g$  i  $cdg$ .

**Twierdzenie 1 (Dualne Twierdzenie Dilwortha)** *W dowolnym skończonym zbiorze częściowo uporządkowanym  $X$  minimalna liczba antyłańcuchów pokrywających zbiór  $X$  jest równa maksymalnej mocy łańcucha.*

**Wniosek 1 (Lemat Dilwortha)** *Jeżeli  $|X| \geq ab + 1$  to  $X$  ma łańcuch mocy  $a + 1$  lub antyłańcuch mocy  $b + 1$ .*

Na ćwiczeniach proszę udowodnić twierdzenie 1 oraz wywnioskować wniosek 1 z twierdzenia 1. Wnioskiem z Wniosku 1 jest znany nam już wynik.

**Wniosek 2 (Tw. Erdősa i Szekeresa)** *Niech  $a, b$  będą liczbami naturalnymi,  $n = ab + 1$  i niech  $x_1, x_2, \dots, x_n$  będzie dowolnym ciągiem  $n$  liczb rzeczywistych. Wówczas ciąg ten zawiera rosnący (malejący) podciąg złożony z  $a + 1$  elementów lub malejący (rosnący) podciąg złożony z  $b + 1$  elementów.*

*Dowód:* Wynika z Wniosku 1 zastosowanego do częściowego porządku, w którym  $x_i \preceq x_j$  wgdy  $i < j$  i  $x_i \leq x_j$ . ■

Teraz podamy bez dowodu najważniejsze twierdzenie tego rozdziału. Jest ono dualne do Dualnego Tw. Dilwortha.

**Twierdzenie 2 (Twierdzenie Dilwortha, 1950)** *W dowolnym skończonym zbiorze częściowo uporządkowanym  $X$  minimalna liczba łańcuchów pokrywających  $X$  jest równa maksymalnej mocy antyłańcucha.*

## 2 Systemy różnych reprezentantów

Niech  $X$  będzie zadany zbiorem. Oznaczmy przez  $2^X$  rodzinę wszystkich podzbiorów zbioru  $X$ . *Rodzina zbiorów* albo *hipergrafem* nazywamy uporządkowaną parę zbiorów  $(X, \mathcal{F})$ , gdzie  $\mathcal{F} \subset 2^X$ . *Systemem różnych reprezentantów (SRR)* rodziny  $(X, \mathcal{F})$ , gdzie  $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$  nazywamy *ciąg  $m$  różnych* elementów, po jednym z każdego zbioru  $A_i$ . Na przykład, jeżeli

$$A_1 = \{2, 4\}, \quad A_2 = \{1, 2, 3\}, \quad A_3 = \{2, 3, 4\}, \quad A_4 = \{1, 4\},$$

to ciąg  $(2, 1, 3, 4)$  jest systemem różnych reprezentantów tej rodziny. Zauważmy przy okazji, że pytanie z 1. wykładu, czy można dopasować kandydatów do stanowisk pracy w taki sposób, by każdy otrzymał pracę zgodnie ze swoimi uprawnieniami, jest pytaniem, czy dla rodziny zbiorów  $\{s, i\}$ ,  $\{s, d\}$ ,  $\{s, d\}$ ,  $\{m, s, c, i\}$ ,  $\{b, i\}$  istnieje system różnych reprezentantów. Odpowiedź brzmi, że tak.

Z drugiej strony, rodzina zbiorów

$$A_1 = \{1, 2\}, \quad A_2 = \{1, 3\}, \quad A_3 = \{1, 4\},$$

$$A_4 = \{1, 2, 3\}, \quad A_5 = \{5, 6\}, \quad A_6 = \{2, 3\},$$

nie ma systemu różnych reprezentantów. Rzeczywiście, wystarczy zauważyć, że cztery zbiory  $A_1, A_2, A_4$  i  $A_6$  mają łącznie tylko trzy różne elementy.

Ta obserwacja pokazuje, że aby rodzina  $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$  miała system różnych reprezentantów, *każda* podrodzina rodziny  $\mathcal{F}$  musi zawierać *co najmniej* tyle elementów, ile zbiorów  $A_i$  wchodzi w skład tej podrodziny. Dokładniej, jeśli  $(x_1, x_2, \dots, x_m)$  jest systemem różnych reprezentantów rodziny zbiorów  $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ , to dla każdego podzbioru indeksów  $S \subset [m]$  zachodzi warunek

$$\left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq \left| \bigcup_{i \in S} \{x_i\} \right| = |S|.$$

Ten warunek konieczny jest jednocześnie warunkiem dostatecznym, co głosi słynne twierdzenie Halla.

**Twierdzenie 3 (Hall, 1935)** Rodzina  $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$  ma system różnych reprezentantów wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego  $S \subseteq [m]$

$$\left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq |S|. \quad (2)$$

### 3 Systemy Spernera

Systemem Spernera (SS) podzbiorów zbioru  $X = [n]$  nazywamy rodzinę zbiorów, z których żaden nie zawiera się w drugim. Krótko, jest to antyłańcuch posetu  $(2^X, \subseteq)$ .

**Problem:** Wyznaczyć

$$\alpha_n = \max\{|\mathcal{F}| : ([n], \mathcal{F}) \text{ jest SS}\}$$

Jest to klasyczny problem ekstremalnej teorii zbiorów, której celem jest wyznaczanie minimalnej bądź maksymalnej mocy rodzin o zadanych własnościach.

Zauważmy, że dla każdego  $k$  mamy  $\alpha_n \geq \binom{n}{k}$ , zatem

$$\alpha_n \geq \max_k \binom{n}{k} = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

**Twierdzenie 4 (Twierdzenie Spernera, 1928)**

$$\alpha_n = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

*Dowód:* Niech  $X = [n]$ . Pokażemy, że poset  $(2^X, \subseteq)$  można rozbić na  $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$  łańcuchów, co na podstawie tw. Dilwortha zakończy dowód. Zauważmy, że  $2^X = \bigcup_{r=0}^n \binom{X}{r}$  oraz, że

$$\binom{n}{0} < \binom{n}{1} < \dots < \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} = \binom{n}{\lceil n/2 \rceil} > \dots > \binom{n}{n-1} > \binom{n}{n}.$$

Stosując tw. Halla można udowodnić (ćw.) następujący lemat.

**Lemat 1** Dla każdego  $r < n/2$  istnieje iniekcja  $f_r : \binom{X}{r} \rightarrow \binom{X}{r+1}$  taka, że dla każdego  $A \in \binom{X}{r}$  mamy  $A \subset f_r(A)$ . Podobnie, dla każdego  $r > n/2$  istnieje iniekcja  $g_r : \binom{X}{r} \rightarrow \binom{X}{r-1}$  taka, że dla każdego  $A \in \binom{X}{r}$  mamy  $A \supset g_r(A)$ .

Ten lemat pozwala skonstruować łańcuchy  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$  przez zlepianie skojarzeń  $(A, f_r(A))$  i  $(g_r(A), A)$ . W przypadku parzystego  $n$ , uzupełniamy je o nieskojarzone elementy ze środkowego poziomu  $\binom{X}{n/2}$  (zrób rysunek). ■

Uogólnieniem twierdzenia Spernera, ale za to z prostszym dowodem jest nierówność LYM.

**Twierdzenie 5 (Lubell 1966, Yamamoto 1954, Mieszalkin 1963)** *Jeśli  $([n], \mathcal{F})$ , gdzie  $\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_m\}$ , jest SS, a  $a_k = |\mathcal{F} \cap \binom{[n]}{k}|$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$ , to*

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\binom{n}{|A_i|}} = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\binom{n}{k}} \leq 1$$

*Dowód błyskawiczny:* Niech  $\Pi_i$  będzie zbiorem tych permutacji zbioru  $[n]$ , których początkowy segment długości  $|A_i|$  składa się z elementów zbioru  $A_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Ponieważ  $\mathcal{F}$  jest SS, to zbiory  $\Pi_1, \dots, \Pi_m$  są parami rozłączne i, co za tym idzie,  $|\Pi_1| + \dots + |\Pi_m| \leq n!$ . Ponadto, łatwo obliczyć, że  $|\Pi_i| = |A_i|!(n - |A_i|)!$ . Dzieląc stronami przez  $n!$ , otrzymujemy nierówność LYM. ■

Ponieważ

$$\frac{m}{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}} \leq \sum_{i=1}^m \frac{1}{\binom{n}{|A_i|}} \leq 1,$$

to tw. Spernera wynika z nierówności LYM.

## 4 Rodziny przecinające się

Rodzinę  $\mathcal{A} \subseteq 2^X$  nazywamy *przecinającą się*, gdy dla dowolnych  $A, B \in \mathcal{A}$  mamy  $A \cap B \neq \emptyset$ . Łatwo pokazać, że największa rodzina przecinająca się  $\mathcal{A} \subseteq 2^{[n]}$  ma rozmiar  $2^{n-1}$  (ćwiczenia).

Teraz ograniczymy się tylko do zbiorów mocy  $r$ , to znaczy, do elementów rodziny  $\binom{[n]}{r}$ . Cała rodzina  $\binom{[n]}{r}$  jest przecinająca się, gdy  $r > n/2$ , a gdy  $r = n/2$ , to z każdej pary zbiorów dopełniających się  $A, A^c$  trzeba odrzucić jeden. Zatem, w tym przypadku największa rodzina przecinająca się ma moc  $\frac{1}{2} \binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1}$ . Najciekawszy jest przypadek  $r < \frac{n}{2}$ .

Niech  $X = [n]$ . Dla  $x \in X$ , oznaczmy przez  $\binom{X}{r}_x$  rodzinę wszystkich  $\binom{n-1}{r-1}$  zbiorów rodziny  $\binom{X}{r}$ , które zawierają element  $x$ . Oczywiście, taka rodzina jest przecinająca się, a co więcej, jest maksymalna (w sensie zawierania) o tej własności. Poniższe, klasyczne twierdzenie pokazuje, że jest to (jedyna co do izomorfizmu) największa rodzina przecinająca się.

**Twierdzenie 6 (Erdős, Ko, Rado, 1961)** Niech  $2 \leq r < n/2$ . Wtedy

(a) każda przecinająca się rodzina  $\mathcal{A} \subseteq \binom{X}{r}$  ma moc nie większą niż  $\binom{n-1}{r-1}$ ,

(b) ograniczenie to jest osiągnięte tylko przez rodziny postaci  $\binom{X}{r}_x$ .

*Dowód (Katona, 1972):* Udowodnimy tylko część (a). Niech  $\mathcal{A} \subseteq \binom{X}{r}$  będzie przecinającą się rodziną zbiorów. Dla dowolnej permutacji cyklicznej  $\sigma$  zbioru  $X$  (jest ich  $(n-1)!$ ), każdy zbiór kolejnych elementów nazywamy segmentem. Niech  $x_\sigma$  będzie liczbą wszystkich zbiorów rodziny  $\mathcal{A}$  będących segmentami w permutacji cyklicznej  $\sigma$ . Ponieważ  $\mathcal{A}$  jest przecinająca się, to  $x_\sigma \leq r$  (ćw.). Z drugiej strony, każdy zbiór mocy  $r$  jest segmentem w dokładnie  $r!(n-r)!$  permutacjach cyklicznych. Stosując metodę dwukrotnego przeliczania, otrzymujemy więc równość

$$\sum_{\sigma} x_{\sigma} = |\mathcal{A}|r!(n-r)!,$$

z której wynika, że

$$|\mathcal{A}| \leq \frac{r(n-1)!}{r!(n-r)!} = \binom{n-1}{r-1}.$$

■

Proszę pokazać na ćwiczeniach, że tw. 6 (obie części) wynika z następującej implikacji: jeśli  $\mathcal{A}$  jest przecinająca się i  $|\mathcal{A}| = \binom{n-1}{r-1}$ , to  $\mathcal{A} = \binom{X}{r}_x$  dla pewnego  $x \in X$ .